

Nouveaux Formicides brésiliens et autres

PAR LE

D^r F. SANTSCHI

Eciton mattogrossensis LUED.

♂♀. — Plus grands que le type *amazona*, aussi grands que *hamatum*, et couleur jaune terne comme chez la var. *funestum* SANTS. à laquelle ils ressemblent beaucoup. Ils en diffèrent par le sillon dorsal du pétiole qui, comme chez *amazona*, est bien plus large et plus profond. Celle-ci est d'un jaune plus vif et doit-être considérée comme variété.

♂. — Diffère de *E. hamatum* par sa couleur d'un roux jaunâtre terne. Les tibias et tarses jaune terne. La tête et le pétiole un peu plus large. Comparé à un individu ♂ de Guyane, considéré comme *hamatum*. L'examen des armures génitales serait désirable, mais je n'ai pu disséquer l'unique exemplaire reçu en communication.

Brésil : Para, Monte Alegre (D^r A. REICHENSBERGER leg).

Eciton burchelli WESTW. v. *viator* n. var.

♂♀. — Long. : 4,5 à 12,5 mm. Roux fauve. Tête plus claire y compris les joues et l'épistome. Bord antérieur de la tête, mandibules et antennes brun noirâtre. Chez l'♀ *media*, le thorax et le pédoncule s'obscurcissent et deviennent plus ou moins brun noirâtre. Chez l'♀ *minor*, seuls le gastre, les articulations des pattes, les tarses et les tibias postérieurs restent roussâtres. Chez le ♂, l'ocelle médian manque ou est à peine indiqué. Le sillon frontal large est moins profond que chez *Foreli*. Le bord occipital entre les épines est moins concave. Les arêtes dorsales de l'épinotum plus parallèles. Postpétiole aussi haut derrière que long.

Colombie : Magdalena, Bunda (FOREL). J'ai observé moi-même une armée de ces Fourmis entre Bunda et Don Diego, en pleine forêt vierge, au bord d'un rio. Comme j'étais descendu de ma monture pour en capturer, des soldats me grimpèrent sur les jambes et me mordirent

Brésil : Minas Geraes, Pirapora (E. GARBE), Museu Paulista, n° 20657.

***Pseudomyrma gracilis* F. v. *bicolor* GUER.**

Cette variété se distingue du type par la couleur du pétiole entièrement roussâtre tandis que chez *gracilis*, sa base seule est éclaircie.

Guyane française : Passoura (LE MOULT) ; Cayenne, Charvein (B. BENOIST).

***Pseudomyrma mutiloides* EM. st. *pupa* FOREL.**

Brésil : Para, Monte Alegre (A. REICHENSPERGER leg.).

***Pseudomyrma Kunckeli* EM. v. *dichroa* FOREL.**

Brésil : Minas Geraes, Pirapora (E. GARBE).

***Pogonomyrmex brevispinosus* SPIN. v. *spinolae* EMERY.**

♀. — (Non décrite). Le gastre est strié dans presque tout le segment basal et les nœuds du pédoncule striés en travers comme dans la var. *senistriata* EM. Elle diffère de cette dernière par ses épines et sa pilosité un peu plus longue. D'un rouge plus sombre qui devient noirâtre vers les mandibules, le devant des joues et le dessus du gastre. La taille un peu plus grande (6 à 6,2 mm.).

Chili : Valparaiso (Miss EDWARDS).

***Pogonomyrmex rastratus* MAYR. v. *pulchellus* n. var.**

♀. — Diffère du type par la couleur du gastre qui est noir, le mésonotum un peu plus étroit et rouge comme la tête. Reste du thorax, épistome, arêtes frontales, mandibules et appendices noirs. Côtés du pronotum strié-ridé en long. Diffère de la var. *caracola* SANTS. par ses dents épinoles plus courtes.

Argentine : Catamarca, Corral Quemado (WEISER).

***Pogonomyrmex Carrettei* SANTS. v. *incultus* SANTS.**

♀. — Catamarca, Corral Quemado (WEISER).

***Pogonomyrmex brevibarbis* EMERY.**

♂. — (Non décrit). Long. : 7 mm. Noir. Mandibules, antennes et tarsi brun clair. Pattes et abdomen brun foncé. Tête, postpétiole et