

STUDIA ENTOMOLOGICA

REVISTA INTERNACIONAL DE ENTOMOLOGIA

Dirigida por
WALTER W. KEMPF, O.F.M.

VOL. XV
(IV+512 páginas)

1972
EDITORA VOZES LTDA., PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL

TEXAS A&M UNIVERSITY LIBRARY

Gênero **Platythyrea** Roger

(Ponerinae: Platythyreini)

Ponera (em parte): Fr. Smith, 1858b: 95*Pachycondyla* (em parte): Fr. Smith, 1858b: 108*Platythyrea* Roger, 1863a: 172

Tipo do gênero: *Pachycondyla punctata* Fr. Smith, 1858b (design. Bingham, 1903).

Revisões (parciais): Mann, 1916: 403 (chave); Kempf, 1964b: 141 (sinopse).

angusta Forel, 1901e: 336 ♀. Loc.-tipo: Trinidad (s. loc.). Distrib.: Trinidad; Guianas; Brasil: PA, AM, RD, MA; Peru.

exigua Kempf, 1964b: 142 ♀♀. Loc.-tipo: Brasil, Mato Grosso: Utiariti.

incerta Emery, 1890b: 56 ♀. Loc.-tipo: Venezuela: San Esteban. Distrib.: Colômbia; Venezuela; Brasil: AM, RD, MT.

meinerti Forel, 1905: 156 ♀. Loc.-tipo: Venezuela: La Moka. Distrib.: Venezuela; Brasil: AP, PA, AM; Guianas; Peru.

meinerti boliviana Santschi, 1921a: 83 ♀. Loc.-tipo: Bolívia: Carandéiti.

pilosula (Fr. Smith, 1858b: 95) ♀. Loc.-tipo: Brasil (s. loc.).

punctata (Fr. Smith, 1858b: 108) ♂♂; Mayr, 1870b: 961 ♀ (*inconspicua*). Loc.-tipo: República Dominicana: Santo Domingo. Distrib.: Antilhas Bahamas, Cuba, Haiti, Rep. Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Guadeloupe, Dominica, Martinique, St. Vincent, Grenada, Barbados; México: Chiapas, Vera Cruz; Guatemala; Honduras; Panamá; Colômbia; Guianas; Brasil: PA.
Sin.: *inconspicua* Mayr, 1870b: 961 (Forel, 1901e: 335)

punctata var. **pruinosa** Mayr, 1870b: 962 ♀ (*pruinosa*); Forel, 1893a: 358 ♂ (*pruinosa*). Loc.-tipo: México (s. loc.). Distrib.: México; Guatemala; Panamá; Colômbia; Antilhas Jamaica, St. Vincent, Grenada, Barbados.

punctata var. **cineracea** Forel, 1886c: 39 ♀. Loc.-tipo: Guatemala: Retalhuleu. Distrib.: Guatemala; Costa Rica; México: Vera Cruz.

sinuata (Roger, 1861a: 297) ♀ (♂). Loc.-tipo: Guiana holandesa (s. loc.).

strenua Wheeler & Mann, 1914: 6 ♀. Loc.-tipo: Haiti: Diquini.

Gênero **Pogonomyrmex** Mayr

(Myrmicinae: Myrmicini)

Atta (em parte): Spinola, 1851: 244*Myrmica* (em parte): Fr. Smith, 1858b: 130*Pogonomyrmex* Mayr, 1868b: 169

Tipo do gênero: *Formica badia* Latreille, 1802a (design. Wheeler, 1911c).

POGONOMYRMEX

Subgénero *Pogonomyrmex* Mayr

Revisões: Kusnezov, 1951d: 246-333; Cole, 1968: 1-222.

- atratus* Santschi, 1922b: 347 ♀ (*vermiculatus* var. *atratus*). Loc.-tipo: Argentina, Mendoza: Tres Esquinas. Distrib.: Argentina: Mendoza, ?Jujuy.
- barbatus* (Fr. Smith, 1858b: 130) ♀; Mayr, 1870b: 971 ♀; Mayr, 1887: 611 (MacCook, 1879) ♂. Loc.-tipo: México (s. loc.). Distrib.: USA; Norte do México até Aguas Calientes, Colima, Vera Cruz, Oaxaca. Sin.: *molefaciens* (Buckley, 1861: 445) (Creighton, 1950: 118)
- bispinosus* (Spinola, 1851: 244) ♀ (♀♂). Loc.-tipo: Chile, Ñuble: Tucapel. Distrib.: Chile.
- bispinosus* var. *intermedius* Menozzi, 1935b: 320 ♀. Loc.-tipo: Chile, Ñuble: Cordillera de Chillán.
- bispinosus* var. *semistriatus* Emery, 1905b: 158 ♀. Loc.-tipo: Chile: Talca. Distrib.: Chile.
- bispinosus* var. *spinolae* Emery, 1905b: 158 (n. n. para *bispinosus* Spinola, 1851: 245) ♀♂ nec ♀; Santschi, 1925a: 223 ♀. Loc.-tipo: Chile, Ñuble: Tucapel. Distrib.: Chile.
- brevibarbis* Emery, 1905b: 158 ♀; Santschi, 1922b: 351 ♀ (*carettei*); Santschi, 1925a: 223 ♂. Loc.-tipo: Argentina, Chubut: Puerto Piramides. Distrib.: Argentina: Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquén.
Sin.: *carettei* Santschi, 1922b: 351 (Kusnezov, 1951d: 250)
ater Donisthorpe, 1933: 532 (Kusnezov, 1951d: 250)
- brevibarbis niger* Santschi, 1925b: 156 ♀♂ (*silvestrii* var. *niger*); Santschi, 1925b: 157 ♀ (*carettei* var. *incultus*). Loc.-tipo: Argentina, Catamarca: Cerro Colorado. Distrib.: Argentina: Catamarca, La Rioja, Salta.
Sin.: *carettei* var. *incultus* Santschi, 1925b: 157 (Kusnezov, 1951d: 250)
- brevibarbis silvestrii* Emery, 1905b: 159 ♀ (*silvestrii*). Loc.-tipo: Argentina: Mendoza. Distrib.: Argentina: Mendoza, San Juan.
Sin.: *brevibarbis longiceps* Santschi, 1917: 277 (Kusnezov, 1951d: 250)
- bruchi* Forel, 1913a: 217 ♀ (*coarctatus bruchi*). Loc.-tipo: Argentina: Buenos Aires. Distrib.: Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Rio Negro.
- carbonarius* Mayr, 1868b: 172 ♀. Loc.-tipo: Argentina, Mendoza: Agua Caliente. Distrib.: Argentina: Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz.
- catanlilensis* Gallardo, 1931a: 187 ♀. Loc.-tipo: Argentina, Neuquén: Catanlil.