

# STUDIA ENTOMOLOGICA

REVISTA INTERNACIONAL DE ENTOMOLOGIA

Dirigida por  
WALTER W. KEMPF, O.F.M.

VOL. XV  
(IV+512 páginas)

1972  
EDITORA VOZES LTDA., PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL

TEXAS A&M UNIVERSITY LIBRARY

Gênero **Ephebomyrmex** Wheeler  
(Myrmicinae: Myrmicini)

*Pogonomyrmex* (em parte): Mayr, 1870b: 970  
*Pogonomyrmex* subgen. *Ephebomyrmex* Wheeler, 1902b: 390  
*Ephebomyrmex*: Kusnezov, 1959a: 353

Tipo do gênero: *Pogonomyrmex naegelii* Forel, 1886c (design. Wheeler, 1911c).

Revisões (parciais): Kusnezov, 1949: 291-307; 1959: 350-355.

- abdominalis** Santschi, 1929: 278 ♀♀ (*naegelii abdominalis*). Loc.-tipo: Argentina, Córdoba: Alta Gracia. Distrib.: Argentina: Córdoba, Misiones; Brasil: MG, SP.
- angustus** (Mayr, 1870b: 970) ♀; (Mayr, 1887: 612) ♀♂. Loc.-tipo: Chile (s. loc.). Distrib.: Chile (Sul); Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut.
- laevigatus** Santschi, 1921a: 97 ♀; Kusnezov, 1949b: 301 ♂. Loc.-tipo: Chile, Llanquihue: Cayutué. Distrib.: Chile (Sul); Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut.
- naegelii** (Forel, 1886c: 41) ♀; (Mayr, 1887: 612) ♀♂. Loc.-tipo: Brasil, Guanabara: Rio de Janeiro. Distrib.: Brasil: RS, SC, PR, SP, RJ, GB, ES, MG, GO, DF, MT, BA, PA; Argentina: Tucumán, Salta, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires; Paraguai; Bolívia; Peru; Guianas; Venezuela. Sin.: *venezuelensis* Weber, 1943b: 69 (Kempf, 1960e: 428)  
*venezuelensis* var. *rupununi* Weber, 1943b: 71 (Kempf, 1960e: 428)
- odoratus** Kusnezov, 1949b: 302 ♀♀♂. Loc.-tipo: Argentina, Río Negro: Bariloche, Cerro Otto. Distrib.: Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut.
- saucius** Wheeler & Mann, 1914: 29 ♀♂. Loc.-tipo: Haiti: Caminho de Manneville à fronteira dominicana. Distrib.: Haiti.
- schmitti** (Forel, 1901b: 339) ♀; Wheeler & Mann, 1914: 29 ♀. Loc.-tipo: Haiti (s. loc.). Distrib.: Haiti.
- schmitti aterrimus** Wheeler, 1936a: 197 ♀. Loc.-tipo: Haiti: entre La Visite e Kenscoff.
- schmitti darlingtoni** Wheeler, 1936a: 197 ♀. Loc.-tipo: Haiti: Massif de la Hotte.
- schmitti sublaevigatus** Wheeler & Mann, 1914: 29 ♀♀ (*schmitti* var. *sublaevigatus*). Loc.-tipo: Haiti: Manneville. Distrib.: Haiti.
- tenuipubens** Santschi, 1936b: 403 ♀. Loc.-tipo: Argentina, Misiones: Loreto.