

maxilares arqueados en la punta se elevan brevemente en la parte media. los forámenes nutricios posteriores del maxilar están situados más atrás que en *Ph. dioptrica*, el pico es más largo, el frontal es más rugoso, las crestas exoccipitales son más robustas, y las cavidades posteriores a las cavidades temporales, que muestra esta parte del occipital, son más profundas; las alas del esfenoideas son más amplias; la porción de apófisis orbitaria inferior, anterior al punto de arranque del hueso yugal, es cóncava, y en la *Ph. dioptrica* es casi plana; los palatinos terminan en punta alcanzando el vómer, y en la especie del río de la Plata concluyen en dos arcos, con una escotadura angular media.

BIBLIOGRAFÍA

R. A. PHILIPPI, *Los delfines de la punta austral de la América del sur*, en *Anales del Museo nacional de Chile*, entrega 1ª, Zoología, página 8, Santiago de Chile, 1893.

R. A. PHILIPPI, *Los cráneos de los delfines chilenos*, en *Anales del Museo nacional de Chile*, entrega 12ª, Zoología, Santiago de Chile, 1896.

G. C. BURMEISTER, *Descripción de cuatro especies de Delfínidos de la costa argentina en el océano Atlántico*, en *Anales del Museo público de Buenos Aires*, serie 1ª, tomo I, páginas 380-388, láminas XXIII y XXIV, figura 2, Buenos Aires, 1869.

G. C. BURMEISTER, *Proceeding Zoological Society*, página 228, figuras 1-2, Londres, 1865.

G. C. BURMEISTER, *Annals and Magazine Natural History*, fasc. 3º, tomo XVI, página 132.

F. W. TRUE, *Review of the family Delphinidae*, Washington, 1883.

F. LAHILLE, *Nota preliminar sobre una nueva marsopa del río de la Plata*, en *Anales del Museo nacional de historia natural*, tomo XXIII, 269-278, láminas VI-IX, Buenos Aires, 1912.

DESCRIPTION

DE

NOUVELLES FOURMIS DE L'ARGENTINE ET PAYS LIMITROPHES

PAR LE DOCTEUR F. SANTSCHI

Les intéressantes fourmis qui font l'objet de cette étude m'ont été envoyées pour la plupart, par M. Carlos Bruch qui en a capturé lui même une grande partie à Alta Gracia dans la province de Córdoba. Il en a aussi observé les mœurs et la nidification, choses qui seront publiées par ses soins. Les autres espèces proviennent de ses actifs correspondants. Qu'ils reçoivent tous ici mes vifs remerciements.

Stigmatomma (Fulakora) elongata Sants. var. **minor** n. var.

♂. Long. 2,8 mm. Varie du noir au brun-jaunâtre. Bord de la tête et appendices jaune roussâtre. Très luisante. Lisse avec une fine ponctuation piligère plus espacée sur le corps que sur la tête. Diffère du type et de la var. *Barretoï* Bruch, par sa taille plus petite et plus ténue. Córdoba, Alta Gracia (Bruch), 4 ♂.

Var. *Barretoï* Bruch. Cette forme ne diffère du type que par la couleur plus foncée du gastre. L'angle postérieur de la tête est aussi arrondi chez le type que chez cette variété.

Ectatomma (Parectatomma) Bruchi n. sp.

♂. Long. 4-4,5 mm. Rouge brunâtre. Appendices et bout du gastre, jaune brunâtre. Soyeuse, densément striée en long. Les stries du dessus du pétiole en général arquées, avec leur convexité en avant. Les stries sont à peine plus fines que chez *triangulare* Mayr. Il y en a

environ 20 entre les arêtes frontales, qui sont plus écartées que chez *triangulare* (12 environ chez cette dernière espèce).

Vu de dessus le pronotum en montre 35 environ (27 chez *triangulare*). Pilosité dressée plus longue et un peu plus abondante. Pubescence moindre sur les appendices, du reste rare.

Tête rectangulaire, légèrement plus longue que large, un peu rétrécie devant; le bord postérieur droit. Les yeux, entre le quart postérieur et le milieu des côtés sont fort convexes. Arêtes frontales très espacées et prolongées en arrière. Épistome transversalement concave au tiers moyen qui est plus large que long. Mandibules lisses et luisantes, striées à leur base; le bord terminal un peu plus long que le bord interne. Sutures du dos du thorax à peine indiquées. Pronotum beaucoup moins convexe que chez *triangulare*, et les épaules plus angulaires, bien que mousses. Épinothum inerme l'angle est à peine indiqué par une petite saillie mousse. Pétiote à peine plus haut que long, convexe dessus, aussi large derrière que long et presque d'un quart plus large derrière que devant. Un grand appendice lamellaire et bidenté au-dessous. Postpétiote plus large que chez *triangulaire* et moins rétréci devant. Le segment suivant à peine plus grand et plus long. Hanches épineuses. Le scape, lisse, dépasse d'un peu plus de son épaisseur le bord postérieur de la tête. Articles du funicule épaissis, les 9° et 10° plus large, que longs; les trois derniers formant presque une massue.

Córdoba, Alta Gracia (Bruch).

Diffère en outre de *E. rastratum* Mayr, par son épinothum non denté, chez *trigonum* les stries sont au contraire plus grosses que chez *triangulare* et chez *E. Hartmanni*, la taille est plus petite.

Typhlomyrmex Bruchi Sants. *in litt.*

Córdoba, Alta Gracia (Bruch).

1 ♀ parmi des *Solenopsis*.

Ponera distinguenda Em. var. **argentina** n. var.

♂. Long. 3,8-4 mm. Diffère du type de l'espèce par ses scapes plus longs, dépassant de leur épaisseur le bord postérieur de la tête. L'écaille est un peu plus épaisse vers le sommet. Pour le reste, semblable.

Argentine: Córdoba, Alta Gracia (Bruch).

Anochetus Mayri Em. st. **neglectus** Em. var. **australis** Em.

Córdoba, Alta Gracia (Bruch).

Odontomachus chelifer Latr. var. **emacerata** n. var.

♀. Long. 12-13 mm. Diffère de *chelifer* par son aspect beaucoup plus gracile. La tête plus étroite, large de 2 mm. à la hauteur des yeux et de 1,6 mm. au cinquième postérieur. Le scape dépasse le bord postérieur de la tête d'un cinquième de sa longueur ou de la longueur du deuxième article du funicule (plus court chez *chelifer*). Les yeux beaucoup plus petits. Mandibules relativement plus longues et plus étroites; les trois dents terminales sont également plus développées. Thorax et gastre plus étroits. Pour le reste, sculpture, pilosité comme chez *chelifer*.

Bésil: Santa Catharina, Blumenau (Reichensperger).

Argentine: Chaco de Santiago del Estero (Wagner). Ce dernier a le thorax jaune brunâtre, les appendices roux.

Il ne s'agit pas ici d'individus parasites de *Mermis*; les abdomens sont petits et non déformés.

Pseudomyrma acanthobia Em. var. **cocae** n. var.

♀. Très voisin du type, dont elle diffère par sa taille plus grande chez toutes les castes.

Long.: ♀ 5-5,5 mm.; ♀ ailée 5,5-6,5 mm.; ♀ reine 7,3 mm.; ♂ 7,5 mm. Sculpture un peu plus accentuée; couleur et taches comme chez le type.

Argentine: Córdoba, Alta Gracia, ♀ ♀ ♂ (Bruch). Dans les branches de cocos (*Eagara coco*).

Pogonomyrmex Weiseri Sants. var. **neuquensis** n. var.

♀. Diffère du type de Catamarca par les interrèdes du thorax encore plus densément ponctuées et mates. L'angle supérieur de l'épinothum n'a que de petites dents mousses, plus petites que les inférieures.

Neuquen, Cerro Policia (Dr. Schiller leg.).