

## CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES FOURMIS DE L'ARGENTINE

PAR LE DOCTEUR F. SANTSCHI

Monsieur le docteur Carlos Bruch m'ayant envoyé un lot de fourmis de la République Argentine, dont quelques formes sont nouvelles et d'autres intéressantes par leur répartition géographique. Je donne ici le résultat de cette courte étude et remercie vivement l'expéditeur.

Sousfamille des **PONERINAE** Lepel.

*Prionopelta bruchi* Sants.

Loreto; Misiones (Dr. A. Ogloblin).

*Holcopenèra brasiliensis* Em. v. *calcarata* Sants.

Légère variété avec seulement 14-15 stries mésoépisternales et 32 entre les yeux. La dent de l'appendice souspétiole un peu moins accusée. Pour le reste semblable.

Iguazú; Misiones (Alberto Breyer). Forme nouvelle pour l'Argentine, le type est de São Paulo, Brésil.

*Neoponera crenata* Rog. st. *confusa* Sants v. *lata* Sants.

Loreto; Misiones (Dr. A. Ogloblin). 1 ♀. Le type de cette variété est de Formosa, Chaco austral.

*Ponera argentina* Sants.

La Paz, Dep. San Javier; Córdoba (C. Bruch) ♀.

*Ponera opaciceps* Mayr v. *pampana* Sants.

Loreto; Misiones (Dr. A. Ogloblin) ♀.

*Pogonomyrmex cunicularis* Mayr st. *pencosensis* For. v. *dubius* For.

Iliar, Dep. Belgrano; La Rioja (M. Gómez) 4 ♂. Les côtés bordant la face déclive de l'épinotum sont doubles comme chez *cunicularis* type, ainsi que l'indique Forel, mais la taille est aussi grande que chez *pencosensis*. Du reste il y a de nombreux passages entre ces deux formes.

*Pogonomyrmex cunicularis* Mayr v. *brevispinus* n. var.

Diffère nettement du type par ses épines épinoles très courtes, pas plus longues que le grand diamètre de l'oeil, confluentes à la base. Le pétiole est distinctement plus étroit, le postpétiole un peu plus long que large derrière. Dos du mésonotum légèrement convexe, et sommet du pétiole mousse, du reste comme chez le type.

Une ergatogyne a une impression métanotale assez forte, le scutellum indiqué par une légère suture surélevé devant. Les épines plus longues que chez l'ouvrière normale.

Estación Sosa; Entre Ríos (Mac Donagh) 3 ♂, 1 ♀ et 1 ♂.

*Pheidole bruchi* For.

Iguazú; Misiones (A. Breyer) ♂.

*Pheidole nitidula* v. *daguerrei* n. var.

♂-Long. 3,7 mm. Brun foncé; gastre noir; joues, mandibules et tarsi, jaune brunâtre. Forme de la tête et sculpture comme chez la var. *richteri* For., mais avec la coloration foncée de la var. *pampana* Sants.

♀ Long. 2 mm. Noire ou presque noire. La tête est un peu moins large que chez *pampana*, plus large que chez *silvicola*. Épines très petites.

Rosas; Buenos Aires (J. Daguerre).

Variété intermédiaire entre *richteri* et *pampana*, diffère de toutes les autres variétés de cette espèce par la couleur.

*Pheidole obtusopilosa* Mayr.

Rosas; Buenos Aires (J. Daguerre) ♂, ♀. Variété plus foncée que le type.

*Crematogaster (Orthocrema) quadriformis* Rog.

Olivos; Buenos Aires (C. Bruch) ♂.

8 (C. Bruch). Va

*cunicularis*» Mayr

stérieure plus hau  
ve postérieure.  
déclive antérieur

se, tête plus clair

s fines et anastomo

amètre de l'oeil.

». *cunicularis* Mayr

plus longues que le

. *brevispinus* Sants

m uni l'épine sup

st. *pencosensis* For

et passe en dehors

v. *dubius* For

gues que leur inter

st. *serpens* Sants

ngue que leur inter

v. *carnivora* Sants