

più è affatto di precoce ossificazione di alcune sue suture.

Un solo carattere non può essere trascurato, quello che si riferisce alla strettezza della fronte. Ma esso non può essere, da solo, ritenuto carattere di stirpe, sìbene ed unicamente carattere individuale. È poi sommamente probabile, che la strettezza della fronte e la differenza nella larghezza tra la porzione anteriore e la posteriore del cranio, dipendano dalla sinostosi della sutura sagittale.

FORMICIDAE NOVAE AMERICANAЕ

COLLECTAE

A PROF. P. DE STROBEL

DESCRIPTAE

A DOTT. GUSTAVO MAXYR



†. CAMPONOTUS PUNCTULATUS n. sp.

Operaria: Long. 4-7.4 mm. Rufa abdome nigro, aut rufa capite (mandibulis antennisque exceptis) et abdome nigris, aut nigra mandibulis, antennis pedibusque rufis; haud copioso pilosa, sparsissime et subtilissime pubescens; caput, thorax et petioli squama ut in Camp. sylvatico Ol.; mandibulae sexdentatae, nitidae, sublaeves (subtilissime coriaceae) punctis dispersis, caput et thorax densissime et subtiliter reticulato-punctata et subopaca, genac insuper punctis dispersis minutis et occiput postice punctis lineolatis; clypeus acute carinatus antice vix productus margine antico recto; abdomen nitidum densus et subtiliter transversim rastratum; tibiae absque pilis absentibus.

Femina: Long. 11 mm. Rufa, capite postice opaco nigro, antice obscure castaneo-fusco, mandibulis castaneis, antennis laete castaneis, thorace supra subnitido castaneo, abdome nitido nigro; sparse pilosa, sparsissime et subtiliter pubescens; caput ut in Operaria; clypeus et margo anticus in medio paulo emarginatus; thorax su-

12. *Pogonomyrmex carbonarius* n. sp.

Operaria: Long. 6.5 mm. *P. rustrato* simillima differt colore nigro, tarsis (metatarsis exceptis) et plus minusve ano fulvis, atque melanoto dentibus 2 trigonis instructo.

Frequens *formicetum* hujus speciei in planicie vasta, *Gran Pampa del Sur* appellata; operaria *lecta* inter rivulum subterraneum *Agua caliente* et torrentem *Rio del Diamante* nominatum; mense Februario 1866. — *Sr. R.*

13. *Phedole aberrans* n. sp.

Miles: Long. 4.5 mm. Flavescens, aut rufo-testaceus, aut plus minusve castaneus, nitidus, mandibulis et saepe partim capite ferrugineis; corpus totum longe et copiose pallide pilosum; mandibulae laevigatae, disperse punctatae, ad basim striatae, margine masticatorio nigro; caput thorace et abdomen latius, elongato-quadrangulare inter laminas frontales depresso, margine postico arcuatim excavato; clypeus in medio transversim concavus et sublaevigatus, lateraliter striatus et transversim convexus; laminae frontales dilatatae, longae, oculos superantes, fortiter divergentes et scapos tote occultantes; scapus brevis lamina frontali paulo brevior; funiculus brevis; area frontalis indistincta; sulcus frontalis tenuis; frons et verticis pars anterior subtiliter et longitudinaliter ruguloso-striatae, striis postice carina transversa distinctissime arcuata, angulos capitis posticos conjungenti, pone hanc transversim et arcuatim carinato-striatus; genae longitudinaliter striatae; oculi minuti; pronotum et mesonotum ad unum fortiter elevata, utrimque supra tuberculo crasso rotundato, inter tuberculata rugoso-partim

arcuatum transverse striato-rugosa; scutellum distinctum, laevigatum, transverso-toriforme; sutura scutello-metanotalis profunde impressa; metanotum spinulis duabus erectis, paulo extra curvalis, parte basali subtiliter coriacea, parte declivi sublaevigata, lateribus infra striatis; petioli rugulosi nodus anticus transversus margine superiore parum aut vix arcuatim emarginato, nodo postico transverso supra lateraliter rotundato; abdomen laeve.

Operaria: Long. 2.5-2.7 mm. Rufa, nitida, abdomen nonnunquam nigricante; corpus totum longe et copiose pallide pilosum; mandibulae laevigatae punctis nonnullis, ad basim striatae; caput, thorace latius, disco laevigato punctis nonnullis dispersis, ad latera longitudinaliter rugulosum et postice rugulis nonnullis transversis; clypeus longitudinaliter striatus, in medio sublaevis; laminae frontales haud longae, longitudinaliter striatae, antice modice dilatatae; genae striatae; pronotum antice subtiliter rugulosum, postice transversim arcuato-carinato striatum; mesonotum disco subcirculariter carinato-striato; scutellum rugulosum distinctissimum, triangulare et elevatum; sutura scutello-metanotalis profunda; metanotum subtiliter reticulato-punctulatum spinulis 2 erectis, paulo divergentibus; petioli nodi subtiliter et superficialiter reticulato-punctati (coriaceo-rugulosi), nodi antici margo superior rotundatus, nodus posticus rotundatus; abdomen laeve.

Inventum formicetum hujus speciei in locis urbi *Buenos Aires* propinquis; anno 1866. — *Str.*