

COMUNICACIONES
DEL
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
« BERNARDINO RIVADAVIA », BUENOS AIRES

Tomo II Buenos Aires, septiembre 24 de 1925 N° 15

(Entomologia. Publ. N° 136)

FOURMIS DES PROVINCES ARGENTINES

DE SANTA FE, CATAMANCA, SANTA CRUZ, CORDOBA ET LOS ANDES

PAR LE D^r J. SANTSCHI

Monsieur le docteur Carlos Bruch m'a encore envoyé un intéressant lot de fourmis de la République Argentine dont plusieurs espèces et variétés étaient encore inédites¹. Voici d'abord la liste des espèces regnues d'après les provinces ou territoires.

Santa Fe. — Récoltées à Rosario, par Mr. Hubrich, à Fives Lille par Mr. C. Bruch, et surtout par Mr. l'ingénieur Weiser. Cette dernière localité est tout particulièrement intéressante par la richesse de ses variétés locales. Les noms d'espèces non suivis de celui de la localité se rapportent à Fives-Lille.

1. *Acanthostichus ramosus* Bruch.
2. *Ectatomma opaciventre* Rog. var. *concolor* Sants.
3. *Pachycondyla striata* Sm.
4. *Ponera opaciceps* Mayr var. *pumpana* n. var.
5. *Leptogenys bohlsi* Em. st. *weiseri* n. st.
6. *Odontomachus haematodes* L.

¹ La plupart des types des espèces décrites dans ce travail ont été offerts par Mr. Carlos Bruch au Musée d'Histoire Naturelle de Buenos Aires et sont conservés dans ses collections.

colle des insectes

(fig. 1, b.).

est brun par sa
s des pattes d'un
brunâtre. L'angle
iole et le dessus
licule est moins
noeud du pétiole
haut mais bien
chez *P. carettei*
de sommet plus
ents épisternales
sins longues. Le
ne chez le type.
: 6,6 mm. Noir.
s, pattes, sillon
un clair. Base du
foncé. Ailes en-
er vures brunes.
rax très finement
e et luisant. Pi-
plus oblique sur

longue que lar-
l droit avec les
assez convexes,
sez écartés, les
es yeux. Mandi-
o plus imprimée
tiligne, une pe-
a pétiole un pen
nettement de ce

Pogonomyrmex carettei Sants. v. **incultus** n. var. (fig. 1. D.).

♂ Long: 6 à 7 mm. Diffère de *P. carettei* par les rides un peu plus grosses sur le front et, au contraire, plus fines avec les intervalles plus larges et plus luisants sur la face occipitale. Celles du thorax moins souvent anastomosées.

Tête rectangulaire, d'1/5 à 1/4 plus longue que large et aussi large derrière que devant. (Aussi large que longue chez *carettei* type et plus rétrécie derrière chez *silvestrii*). La face basale de l'épinotum plus rétrécie derrière. Les épines paraissent plus courtes quand on les regarde de devant parce que la bandelette qui unit leur bases est plus développée que chez *carettei*. Vues de profil elles sont aussi développées, mais moins relevées et bien plus longues que les dents épisternales. Le noeud du pétiole moussé au sommet et sa face antérieure un peu moins abrupte. Postpétiole un peu plus long que large. Le psammophore est encore plus incomplet et irrégulier. Pour le reste comme chez *carettei*.

♀ Funicule d'un brun plus clair, dents de l'épinotum un peu plus courtes. Noeud du pétiole un peu plus allongé, du reste comme la ♀ de *carettei*.

Catamarca: Cerro Colorado (Weiser) 1 ♀, 10 ♂.

Les *Pogonomyrmex imberbis* Em. *silvestrii* Em. et *carettei* Sants. font transitions au S. G. *Ephebomyrmex* Wheeler par la pauvreté de leur psammophore.

Pheidole (Elasmopheidole) obnixa For. (*Ph. arciruga* For. r. *obnixa* For. Mém. Soc. Ent. Belgique, 1912, p. 236.)

♀. (Non décrit). Long 4 mm. Très voisin de *Ph. taurus* Em. dont il diffère comme suit: La tête est beaucoup plus foncée, d'un brun noirâtre derrière passant au noir dans la moitié antérieure. Les rides occipitales plus serrées, commençant immédiatement après la forte ride ou crête du vertex (Chez *taurus* il y a un espace lisse, assez grand, puis une deuxième crête au bord postérieur de la tête). Le devant de la crête du vertex est transversalement ridée chez *obnixa* et pas chez *taurus*, ou obliquement. Les mandibules sont fortement striées à la base (à peine un peu ridées chez *taurus*). Noeud du pétiole plus tran-