

DESCRIPTION DE QUELQUES NOUVELLES FOURMIS

DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

PAR LE DOCTEUR F. SANTSCHI

Les fourmis qui font l'objet de ces descriptions m'ont été communiquées par mon estimé collègue, monsieur Ch. Bruch, qui les a en grande partie découvertes lui-même tout en observant leurs mœurs. Qu'il reçoive ici mes vifs remerciements.

Pogonomyrmex brevibarbis Em. et **longiceps** n. sp.

♂ Long., 5,5-6,2 mm. Noire. Mandibules, funicule, souvent le scape, tarses et souvent les tibias et les fémurs, cou et souvent le bord antérieur du pronotum roussâtres. Base des cuisses et du pédicule rougâtre. Dos du thorax irrégulièrement réticulé-rugueux, côtés du pronotum ridés parallèlement à son bord et perpendiculairement aux rides des côtés du méso-épinotum. Face déclive de l'épinotum et abdomen lisses et luisants. Scape striolé. Pilosité brunâtre obtuse, un peu plus courte que l'épaisseur des cuisses. Psammophore incomplet, les macrochètes de la gula étant bien plus courts en arrière que devant.

Tête rectangulaire, un cinquième environ plus longue que large. Yeux convexes, assez grands au milieu des côtés. Le scape atteint le bord postérieur. Épistome faiblement convexe, son bord antérieur largement concave dans le tiers médian. Mandibules striées de 6 dents. Thorax étroit, à prothorax dorsal presque droit, un peu abaissé

devant les épines; celles-ci se touchent presque à leur base et sont un peu moins longues que l'intervalle de leur extrémité. Face déclive bordée et étroite de façon à bien recevoir le pétiole. Celui-ci aussi allongé que chez *P. Silvestrii* Em., mais avec un nœud plus anguleux. Postpétiole conique, plus long que large à sa base. Pour le reste, comme la description de *P. brevibarbis* Em. dont il diffère surtout par sa tête allongée (carrée chez *brevibarbis*).

Province de San Juan : Pociños. (A. Brasco leg.)

Rogeria Foreli Em.

Tandil (Ch. Bruch, 1 ♂.)

Pheidole (Elasmopheidole) cavifrons Em.

Tandil (Ch. Bruch, ♀, ♂).

La tête de ♀ est un peu plus allongée que chez la var. *fuscipunctis* Sants.

Pheidole obtusopilosa Mayr

♂ (non décrit). Long., 3,6 mm. Noir brunâtre. Mandibules, antennes, nervures alaires, tarses et articulations des pattes jaunâtres; le reste des pattes et bord des mandibules brun jaunâtre. Lisse et luisant, sauf la tête, le métanotum, le dessus de l'épinotum et le pédicule qui sont mates et réticulés-ponctués. La tête a en outre des rides longitudinales contournant derrière l'ocelle médian. Pilosité jaunâtre, fine, pointue et plus longue que chez le ♀, implantée dans des gros points. Tête trapézoïdale avec les angles formés par les yeux et les ocelles, près du double plus larges en avant qu'en arrière, les bords presque droits. Les yeux occupent la moitié antérieure des côtés. Épistome convexe, presque lisse. Mandibules de deux dents peu développées. Scape un peu plus long que les deux articles suivants réunis. Le premier du funicple un peu plus épais que long, les suivants près d'un quart plus longs qu'épais. Ailes hyalines, la supérieure longue de 4,2 mm. Les deux faces de l'épinotum subégales, avec l'angle arrondi. Postpétiole triangulaire sur le profil avec un sommet bas, mousse et un peu reculé. Postpétiole le double plus large que long avec les angles antérieurs subdentés.

Tandil (Bruch, ♂, ♀, ♂).

♂. Long., 3,6 mm. Mandibules, antennes, nervures alaires, tarses et articulations des pattes jaunâtres; le reste des pattes et bord des mandibules brun jaunâtre. Lisse et luisant, sauf la tête, le métanotum, le dessus de l'épinotum et le pédicule qui sont mates et réticulés-ponctués. La tête a en outre des rides longitudinales contournant derrière l'ocelle médian. Pilosité jaunâtre, fine, pointue et plus longue que chez le ♀, implantée dans des gros points. Tête trapézoïdale avec les angles formés par les yeux et les ocelles, près du double plus larges en avant qu'en arrière, les bords presque droits. Les yeux occupent la moitié antérieure des côtés. Épistome convexe, presque lisse. Mandibules de deux dents peu développées. Scape un peu plus long que les deux articles suivants réunis. Le premier du funicple un peu plus épais que long, les suivants près d'un quart plus longs qu'épais. Ailes hyalines, la supérieure longue de 4,2 mm. Les deux faces de l'épinotum subégales, avec l'angle arrondi. Postpétiole triangulaire sur le profil avec un sommet bas, mousse et un peu reculé. Postpétiole le double plus large que long avec les angles antérieurs subdentés.