

COMUNICACIONES
DEL
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
« BERNARDINO RIVADAVIA », BUENOS AIRES

Tomo II Buenos Aires, septiembre 24 de 1925 N° 15

(Entomologia. Publ. N° 136)

FOURMIS DES PROVINCES ARGENTINES

DE SANTA FE, CATAMANCA, SANTA CRUZ, CÓRDOBA ET LOS ANDES

PAR LE D^r J. SANTSCHI

Monsieur le docteur Carlos Bruch m'a encore envoyé un intéressant lot de fourmis de la République Argentine dont plusieurs espèces et variétés étaient encore inédites¹. Voici d'abord la liste des espèces regnues d'après les provinces ou territoires.

Santa Fe. — Récoltées à Rosario, par Mr. Hubrich, à Fives Lille par Mr. C. Bruch, et surtout par Mr. l'ingénieur Weiser. Cette dernière localité est tout particulièrement intéressante par la richesse de ses variétés locales. Les noms d'espèces non suivis de celui de la localité se rapportent à Fives-Lille.

1. *Acanthostichus ramosus* Bruch.
2. *Ectatomma opaciventre* Rog. var. *concolor* Sants.
3. *Pachycondyla striata* Sm.
4. *Ponera opaciceps* Mayr var. *pumpana* n. var.
5. *Leptogenys bohlsi* Em. st. *weiseri* n. st.
6. *Odontomachus haematodes* L.

¹ La plupart des types des espèces décrites dans ce travail ont été offerts par Mr. Carlos Bruch au Musée d'Histoire Naturelle de Buenos Aires et sont conservés dans ses collections.

Argentine. Santa Fe: Fives Lille (Weiser).

Monsieur Bruch m'écrit que cette variété récolte des insectes dont elle approvisionne son nid.

Pogonomyrmex silvestrii Em. v. niger n. var. (fig. 1, b.).

♂ Long: 5,5 à 6,5 mm. Diffère du type qui est brun par sa couleur franchement noire. Funicule et parties des pattes d'un brun moyen. Mandibules et pétiole d'un rouge brunâtre. L'angle dessiné par la face antérieure du noeud du pétiole et le dessus

de son pédicule est moins ouvert. Le noeud du pétiole est plus haut mais bien moins que chez *P. carettei* Sants. et le sommet plus arrondi. Dents épisternales un peu moins longues. Le reste comme chez le type.

♂ Long: 6,6 mm. Noir. Mandibules, pattes, sillon de Mayr brun clair. Base du gastre brun foncé. Ailes enfumées, à nervures brunes.

Tête et thorax très finement




Fig. 5. — a, *Pogonomyrmex silvestrii* Em.; b, var. *niger* Sants.; c, *P. carettei* Sants.; d, var. *incultus* Sants.

striés en longueur, assez luisant; le reste lisse et luisant. Pilosité dressée assez longue et fine sur le corps, plus oblique sur les pattes, manque sur les antennes.

La tête, sans les yeux, est de $1/5$ à $1/4$ plus longue que large, arrondie derrière les yeux, le bord cervical droit avec les angles marqués, plus étroite devant. Les yeux assez convexes, occupent le tiers moyen des côtés. Ocelles assez écartés, les postérieurs aussi éloignés l'un de l'autre que des yeux. Mandibules striées, de 4 dents. Aire frontale beaucoup plus imprimée que chez *carettei*. Face basale de l'épinothum rectiligne, une petite dent à l'angle des deux faces. Le noeud du pétiole un peu plus bas et arrondi que chez *carettei*. Diffère nettement de ce dernier par sa tête bien plus longue.

Catamarca: Cerro Colorado (Weiser) 1 ♂ 5 ♀.