

## Nouveaux Formicides brésiliens et autres

PAR LE

D<sup>r</sup> F. SANTSCHI

### **Eciton mattogrossensis** LUED.

♂♀. — Plus grands que le type *amazona*, aussi grands que *hamatum*, et couleur jaune terne comme chez la var. *funestum* SANTS. à laquelle ils ressemblent beaucoup. Ils en diffèrent par le sillon dorsal du pétiote qui, comme chez *amazona*, est bien plus large et plus profond. Celle-ci est d'un jaune plus vif et doit-être considérée comme variété.

♂. — Diffère de *E. hamatum* par sa couleur d'un roux jaunâtre terne. Les tibias et tarse jaune terne. La tête et le pétiote un peu plus large. Comparé à un individu ♂ de Guyane, considéré comme *hamatum*. L'examen des armures génitales serait désirable, mais je n'ai pu disséquer l'unique exemplaire reçu en communication.

Brésil : Para, Monte Alegre (D<sup>r</sup> A. REICHENSBERGER leg).

### **Eciton burchelli** WESTW. v. *viator* n. var.

♂♀. — Long. : 4,5 à 12,5 mm. Roux fauve. Tête plus claire y compris les joues et l'épistome. Bord antérieur de la tête, mandibules et antennes brun noirâtre. Chez l'♀ *media*, le thorax et le pédoncule s'obscurcissent et deviennent plus ou moins brun noirâtre. Chez l'♀ *minor*, seuls le gastre, les articulations des pattes, les tarse et les tibias postérieurs restent roussâtres. Chez le ♂, l'ocelle médian manque ou est à peine indiqué. Le sillon frontal large est moins profond que chez *Foreli*. Le bord occipital entre les épines est moins concave. Les arêtes dorsales de l'épinothorax plus parallèles. Postpétiote aussi haut derrière que long.

Colombie : Magdalena, Bunda (FOREL). J'ai observé moi-même une armée de ces Fourmis entre Bunda et Don Diego, en pleine forêt vierge, au bord d'un rio. Comme j'étais descendu de ma monture pour en capturer, des soldats me grimèrent sur les jambes et me mordirent

...s arracher, les têtes restaient fixées dans la  
...s difficilement. J'ai encore une de ces têtes  
... 1896).  
Puru (GÖLDI).

## ANALYTIQUE

### DECITON BUCHELLI MAYR.

...pris l'abdomen . . . . . 2.  
... le gastre jaune roussâtre ou ocré . . . 4.  
... clair que le reste de la tête chez le ♀, un  
... le. Brésil . . . . . v. *Foreli* MAYR.  
... res chez le ♀. . . . . 3.  
... peine saillantes. Guatemala . . . . .  
... . . . . . v. *parvispinus* FOR.  
... pées. Mexique. v. *infuscatum* WHEELER.  
Abdomen, tibias postérieurs et tarses d'un  
... . . . . . v. *urichi* FOREL.  
... (sans les mandibules). Gastre roussâtre. 5.  
Crête occipitale entre les épines très con-  
... quay. Bolivie . . . v. *Burchelli* MAYR.  
... à peine indiqué. Crête occipitale médio-  
... mbie. Brésil Nord. . . v. *viator* SANTS.  
... r SM. v. *anceps* n. var.

...noire. Abdomen, scape, moitié distale du  
...assez foncé. Mandibules, condyle du scape,  
...e roussâtre. Luisante à travers la pubescence  
...r place. Moins pileuse que *Ps. mutiloides*  
...ez cette espèce avec les yeux occupant les  
...les côtés. Dessus du pronotum bordé, plus  
...ans le col). Face basale de l'épinotum à  
...ne large courbe régulière à la face déclive.  
...liculé devant sur le profil qui descend en  
...articulation antérieure. Vu de dessus, le  
...omme un étranglement aussi long que la  
...s est droit avec de petits denticules aux  
...st à peine plus long que sa largeur maxima

Brésil : Minas Geraes, Pirapora (E. GARBE), Museu Paulista,  
n° 20657.

### *Pseudomyrma gracilis* F. v. *bicolor* GUER.

Cette variété se distingue du type par la couleur du pétiole entière-  
ment roussâtre tandis que chez *gracilis*, sa base seule est éclaircie.

Guyane française : Passoura (LE MOULT) ; Cayenne, Charvein  
(B. BENOIST).

### *Pseudomyrma mutiloides* EM. st. *pupa* FOREL.

Brésil : Para, Monte Alegre (A. REICHENSBERGER leg.).

### *Pseudomyrma Kunckeli* EM. v. *dichroa* FOREL.

Brésil : Minas Geraes, Pirapora (E. GARBE).

### *Pogonomyrmex brevispinosus* SPIN. v. *spinolae* EMERY.

♀. — (Non décrite). Le gastre est strié dans presque tout le segment  
basal et les nœuds du pédoncule striés en travers comme dans la var.  
*senistriata* EM. Elle diffère de cette dernière par ses épines et sa  
pilosité un peu plus longue. D'un rouge plus sombre qui devient noirâ-  
tre vers les mandibules, le devant des joues et le dessus du gastre. La  
taille un peu plus grande (6 à 6,2 mm.).

Chili : Valparaiso (Miss EDWARDS).

### *Pogonomyrmex rastratus* MAYR. v. *pulchellus* n. var.

♀. — Diffère du type par la couleur du gastre qui est noir, le méso-  
notum un peu plus étroit et rouge comme la tête. Reste du thorax,  
épistome, arêtes frontales, mandibules et appendices noirs. Côtés du  
pronotum strié-ridé en long. Diffère de la var. *caracola* SANTS. par ses  
dents épinoles plus courtes.

Argentine : Catamarca, Corral Quemado (WEISER).

### *Pogonomyrmex Carrettei* SANTS. v. *incultus* SANTS.

♀. — Catamarca, Corral Quemado (WEISER).

### *Pogonomyrmex brevibarbis* EMERY.

♂. — (Non décrit). Long. : 7 mm. Noir. Mandibules, antennes et  
tarses brun clair. Pattes et abdomen brun foncé. Tête, postpétiole et